# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 05/12/2022

## Dénomination du médicament

**PATES BAUDRY, pâte à sucer**

## Encadré

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après trois jours.

## Que contient cette notice ?


1. Qu'est-ce que PATES BAUDRY, pâte à sucer et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PATES BAUDRY, pâte à sucer ?
3. Comment prendre PATES BAUDRY, pâte à sucer ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PATES BAUDRY, pâte à sucer ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.


## 1. QU'EST-CE QUE PATES BAUDRY, pâte à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : médicament homéopathique
Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique de la toux.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PATES BAUDRY, pâte à sucer ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais PATES BAUDRY, pâte à sucer :**

- Chez l'enfant de moins de 6 ans.
- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

**Avertissements et précautions**

- Ce médicament contient 68 mg de sorbitol par pâte. Le sorbitol est une source de fructose. Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) présentiez une intolérance à certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose (IHF), un trouble génétique rare caractérisé par l'incapacité à décomposer le fructose, parlez-en à votre médecin avant que vous (ou votre enfant) ne preniez ou ne receviez ce médicament.
- Ce médicament contient 3,7 mg de propylène glycol par pâte.
- Ce médicament contient du glucose et du saccharose. Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) présentiez une intolérance à certains sucres parlez-en à votre médecin avant que vous (ou votre enfant) ne preniez ou ne receviez ce médicament.
- Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E124) et peut provoquer des réactions allergiques.

**Enfants**
Sans objet.
**Autres médicaments et PATES BAUDRY, pâte à sucer**
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
**PATES BAUDRY, pâte à sucer avec des aliments et boissons**
Sans objet.
**Grossesse et allaitement**
Compte-tenu de la hauteur de dilution des souches et malgré l'absence de données expérimentales et cliniques suffisantes, PÂTES BAUDRY, pâte à sucer peut être utilisé chez la femme enceinte ou allaitant.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**
Sans objet.
**PATES BAUDRY, pâte à sucer contient du saccharose, du glucose, du sorbitol (E420), du colorant rouge ponceau 4R (E124) et du propylène glycol (E1520).**

## 3. COMMENT PRENDRE PATES BAUDRY, pâte à sucer ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 6 ans.**

**Posologie**

Adultes : 6 à 12 pâtes à sucer, au maximum, par jour.

Enfants à partir de 6 ans : 6 pâtes à sucer, au maximum, par jour.

Espacer les prises en fonction de l'amélioration.

**Mode d'administration**

Voie buccale.

**Durée du traitement**

La durée de traitement ne doit pas dépasser une semaine.

Une absence d'amélioration au bout de 3 jours doit amener à consulter un médecin.

**Si vous avez pris plus de PATES BAUDRY, pâte à sucer que vous n'auriez dû**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre PATES BAUDRY, pâte à sucer**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre PATES BAUDRY, pâte à sucer**

Sans objet.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.signalement-sante.gouv.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER PATES BAUDRY, pâte à sucer ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

### Ce que contient PATES BAUDRY, pâte à sucer

· Les substances actives sont :

Aconitum napellus 5 CH..... 1,42 mg
Belladonna 5 CH..... 1,42 mg
Bryonia 5 CH..... 1,42 mg
Coccus cacti 5 CH..... 1,42 mg
Drosera 5 CH..... 1,42 mg
Ipeca 5 CH..... 1,42 mg

Pour une pâte à sucer de 1 g.

· Les autres composants sont : Gomme arabique, saccharose, glucose, sorbitol (E420), colorant rouge ponceau 4R (E124), propylène glycol (E1520).

### Qu'est-ce que PATES BAUDRY, pâte à sucer et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de pâte à sucer. Boîte de 70 g environ.

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

**BOIRON**
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY

### Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

**BOIRON**
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY

### Fabricant

**BOIRON**
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY

### Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).